

تومور مغزی :

تومور مغزی در واقع نوعی ضایعه موضعی داخل جمجمه ای است که فضایی را در داخل جمجمه اشغال کرده است که به شکل توده ای کروی رشد می کند اما می تواند به طور منتشر نیز رشد نماید و باعث حملات تشنجی و افزایش فشار داخل جمجمه و ورم شود .

انواع :

تومور های مغزی اولیه از سلول های درونی مغز نشأت گرفته اند اما تومور های مغزی ثانویه از ساختمان های خارج مغز به مغز می رسند که می توانند خوش خیم یا بدخیم باشند .

علل :

قرار گیری در معرض اشعه

جهش های ژنی و زمینه خانوادگی

تظاهرات بالینی :

افزایش فشار داخل مغز که با سر درد - تهوع - استفراغ - اختلالات بینایی - تغییرات شخصیتی - اختلالات حسی - حرکتی می تواند همراه باشد.
نشانه های موضعی مثل حملات تشنجی ، تغییرات شناختی - اختلالات گفتاری.

سرگیجه ، تلو تلو خوردن هنگام راه رفتن ، وزوز گوش ، بی حسی و سوزن سوزن شدن ناحیه صورت و زبان ، از دست دادن حافظه ، اضطراب ، اختلال خواب ، تنگی نفس .

یافته های تشخیصی :

گرفتن تاریخچه بیماری و معاینه عصبی
تصویر برداری سی تی اسکن با ماده حاجب

MRI

آنژیوگرافی مغزی

نمونه برداری از تومور

نوار مغز

بررسی مایع مغزی - نخاعی

تدابیر درمانی :

استفاده از داروهایی که مایعات موجود مغز را کم می کند و دارو های ضد تشنج
شیمی درمانی

رادیوتراپی

روش جراحی

مراقبت :

قرار دادن بیمار در وضعیت نشسته و قائم حین غذا خوردن و استفاده از رژیم غذایی نیمه جامد و در دسترس بودن ساکشن چرا که به دلیل تومور توانایی بلع بیمار ضعیف شده است .

ایجاد محیطی زیبا و جذاب هنگام غذا خوردن .در وضعیت های آرام به بیمار غذا بدهید .

در صورت پیشرفت بیماری دادن غذا از راه لوله بینی - معده ای

استفاده از مایعات و غذای پر فیبر به اندازه کافی چرا که یبوست به دلیل کاهش مصرف مایعات روی می دهد .



بیمارستان امام حسین (ع) بيجار

تومور مغزی



IHH-PE-PA-ICU04

واحد آموزش به بیمار و سلامت همگانی

شماره تلفن: ۰۸۷۳۸۲۳۶۰۶۸

آدرس وب سایت بیمارستان:

<https://muk.ac.ir/Page?pagelid=۲۳>

با کمک گروه های حمایتی حس قدرت و دلگرمی بیمار افزایش می یابد .

به دلیل کاهش حرکت اختلال در سلامت پوست ایجاد می شود پس پوست بیمار تمیز و خشک نگه داشته شود ماساژ نیز توصیه می شود .



منبع:

جانسیال .هینکل .کریاچ.چیویر . 4112 پرستاری داخلی جراحی
بیماریهای اعصاب
(. Consult Nursing برونر و سودارث)، ترجمه :عالیخانی، م .
ویرایش سیزدهم .تهران، انتشارات جامعه نگرو سالمی 4 .

از غذاهای مورد علاقه بیمار استفاده کنید . معمولا بیمار تهوع ، استفراغ دارد .

تسکین و کنترل درد با داروهای تجویز شده بهداشت دهان – دندان

مراقبت از وضعیت تنفسی به دلیل تنگی نفس

آماده کردن بیمار به زمان ، مکان و اشخاص با استفاده از وسایل آشنا مثل عکس ها ، فیلم

به بیمار در فعالیت های مراقبت از خود مثل حمام کردن ، لباس پوشیدن ، کمک کنید البته در حد امکان استقلال بیمار حفظ شود .

جلو گیری از آسیب مخصوصا در بیماری که به دلیل تومور دچار تشنج می شود .

استفاده از عصا و واکر برای راه رفتن

کمک به عملکرد حرکتی – حسی – گفتاری

حمایت روحی – روانی به دلیل اضطراب و ترس و کمک برای وضعیت خواب بهتر

با بیمار از طریق گفتگو و بیان احساسات و کمک از مددکار اجتماعی – افراد روحانی و مشاوران روانی ارتباط برقرار کنید .